

## X. Drei neue Platygasteriden.

Von

Prof. Dr. J. J. Kieffer.

### *Amblyaspis norvegicus* n. sp.

♀. Schwarz; Scapus und Beine, ausgenommen die Coxae, gelbrot. Kopf unbehaart, dreimal so breit wie lang, von vorn gesehen fast kreisrund, glatt und glänzend; Ocellen eine kaum gebogene Linie bildend, die äusseren von den Augen so weit entfernt als von der vorderen. Scapus walzenrund; 2. Glied doppelt so lang wie dick; die 4 folgenden nicht länger als dick, die 4 letzten plötzlich verdickt, nicht länger als dick, das letzte kurz eirund, vom vorletzten wenig deutlich getrennt. Mesonotum stark gewölbt, kahl, vorn verengt und halb so breit wie hinten, ohne Parapsidenfurchen. Scutellum nach hinten allmählich zugespitzt, dicht und grau feinhaarig. Metapleuren und Petiolus feinhaarig. Flügel fast glashell, das Abdomen überragend. Petiolus nicht länger als dick, längsgestreift; Abdomen flach, ziemlich spindelförmig, vorn dorsal, sowie in dem ventralen vorderen Drittel feinhaarig; 2. Tergit die 2 vorderen Drittel einnehmend; 3.—5. Tergit gleich lang, das 6. so lang wie das 4. und 5. zusammen; 3.—6. quer, zusammen ein Dreieck bildend, welches so breit wie lang ist. Länge: 1,6 mm. — Norwegen: Rörvik, Vikten 10. 8. 03. (coll. STRAND).

### *Amblyaspis Strandii* n. sp.

♂. Schwarz; Antennen braun, die 2 proximalen Glieder, Coxae und Beine gelb. Das 2. Antennenglied fast doppelt so

lang wie dick; 3. und 4. wenig getrennt, 5.—10. gleich dick, 5.—9. so lang wie dick, 10. eirund. Abdomen sehr flach gedrückt, länglich elliptisch; 2. Tergit die 2 vorderen Drittel einnehmend; 3.—7. Tergit stark quer, alle gleich lang. Alles übrige wie bei voriger Art. Länge: 1,5 mm. — Norwegen: Ranum, Overhalden 24. 8. 03 (STRAND leg.).

*Polygnotus luctuosus* n. sp.

♂. Ganz schwarz. Kopf doppelt so breit wie lang; Ocellen eine Querlinie bildend, die äusseren sind vom Augenrand um mehr als ihren Durchmesser entfernt. Das 2. Antennenglied ist fast doppelt so lang wie dick; 3. klein, vom 4. wenig getrennt, dieses dicker und schwach bogig; 5. etwas kürzer als das 6.; 6.—9. wenig länger als dick, gleich dick; das 10. etwas länger als das vorletzte. Parapsidenfurchen durchlaufend und divergierend. Scutellum halbreisförmig, dick, höher als das Mesonotum und von diesem durch einen tiefen Eindruck getrennt. Abdomen eirund und flach; Petiolus quer; 2. Tergit die 2 vorderen Drittel einnehmend, beiderseits vorn mit einem länglichen Eindruck. Länge: 1,2 mm. — Deutschland: Marburg (coll. STRAND).